



Гибриды подсолнечника компании Limagrain

ЛГ 5377

Очень ранний гибрид с высоким потенциалом урожайности

Группа спелости: ранний

Тип растения: среднерослый

Общие характеристики

- очень ранний гибрид с высоким потенциалом урожайности
- высокий уровень масличности
- очень хорошая толерантность к основным заболеваниям
- высокая энергия начального роста
- толерантен к новым расам ложной мучнистой росы

Толерантность к заболеваниям

Фомопсис	9
Белая гниль корня	8
Белая гниль корзинки	9
Пепельная гниль	8
Сухая гниль	7
Фомоз	8
Ржавчина	8

Агрономические характеристики

- Средний диаметр корзинки, см: 15,9
- Средняя масса 1000 зерен, г: 70

Рекомендуемая густота на момент уборки

- зона достаточного увлажнения: 55-60 тыс./га
- зона недостаточного увлажнения: 50-55 тыс./га

Рекомендации по возделыванию

Прекрасно подходит для регионов с коротким периодом вегетации

ЛГ 50270

Ранний гибрид устойчивый к болезням А—G рас

Группа спелости: ранний

Тип растения: среднерослый

Общие характеристики

- очень ранний гибрид с высоким потенциалом урожайности
- устойчив к болезням А-G рас
- высокий уровень масличности
- хорошая толерантность к основным заболеваниям
- толерантен к новым расам ЛМР
- высокая энергия начального роста
- пластичен к различным условиям возделывания

Толерантность к заболеваниям

Фомопсис	9
Белая гниль корня	8
Белая гниль корзинки	9
Пепельная гниль	8
Сухая гниль	7
Фомоз	8
Ржавчина	8

Агрономические характеристики

- средний диаметр корзинки, см: 17
- средняя масса 1000 зерен, г: 65

Рекомендуемая густота на момент уборки

- Зона достаточного увлажнения: 55-60 тыс./га
- Зона недостаточного увлажнения: 50-55 тыс./га

Рекомендации по возделыванию

Прекрасно подходит для регионов с коротким периодом вегетации и риском поражения болезнью

ЛГ 50480

Ранний гибрид, устойчивый к засухе и расам заразихи А-Г с высокой энергией начального роста

Группа спелости: ранний

Тип растения: среднерослый

Общие характеристики

- ранний гибрид;
- высокий потенциал урожайности и масличности в своей группе спелости;
- устойчив к заразице рас А-Г;
- пластичен в засушливых условиях;
- толерантен к основным заболеваниям, включая новые расы ЛМР

Толерантность к заболеваниям

Фомопсис	8
Белая гниль корня	9
Белая гниль корзинки	8
Пепельная гниль	7
Сухая гниль	8
Фомоз	9
Ржавчина	6
Вертициллез	7

Агрономические характеристики

- средний диаметр корзинки, см: 17
- средняя масса 1000 зерен, г: 75

Рекомендуемая густота на момент уборки

- Зона достаточного увлажнения: 55-60 тыс./га
- Зона недостаточного увлажнения: 50-55 тыс./га

Рекомендации по возделыванию

Прекрасно подходит для регионов с недостатком влаги и риском поражения заразицей

ЛГ 50300

Ранний высокоолеиновый гибрид с устойчивостью к болезням А—G рас

Группа спелости: Ранний

Тип растения: среднерослый

Общие характеристики

- ранний высокоолеиновый гибрид
- стабильно высокое содержание олеиновой кислоты в различных условиях выращивания
- устойчив к болезням А-G
- хорошая толерантность к основным заболеваниям, включая новые расы ЛМР
- пластичен в засушливых условиях возделывания

Толерантность к заболеваниям

Фомопсис	8
Белая гниль корня	8
Белая гниль корзинки	8
Пепельная гниль	8
Сухая гниль	9
Фомоз	8
Ржавчина	9

Агрономические характеристики

- Средний диаметр корзинки, см: 17
- Средняя масса 1000 семян, г: 71

Рекомендуемая густота на момент уборки

- зона достаточного увлажнения: 50-55 тыс./га
- зона недостаточного увлажнения: 45-50 тыс./га

Рекомендации по возделыванию

для зон с коротким периодом вегетации и риском поражения болезнью

ЛГ 5478

Интенсивный гибрид, толерантный к основным заболеваниям подсолнечника и устойчивый к расам заразики А—F

Группа спелости: Среднеранний

Тип растения: среднерослый

Общие характеристики

- интенсивный гибрид нового поколения
- обладает высокими урожайностью и масличностью
- устойчив к заразику А-F рас
- обладает высокой толерантностью к основным болезням
- адаптирован для зон достаточного увлажнения
- толерантен к новым расам ЛМР

Толерантность к заболеваниям

Фомопсис	9
Белая гниль корня	8
Белая гниль корзинки	8
Пепельная гниль	8
Сухая гниль	8
Фомоз	8
Ржавчина	8

Агрономические характеристики

- Средний размер корзинки, см: 18
- Средняя масса 1000 семян, г: 65

Рекомендуемая густота на момент уборки

- зона достаточного увлажнения: 55-60 тыс./га
- зона недостаточного увлажнения: 50-55 тыс./га

Рекомендации по возделыванию

потенциал урожайности максимально раскрывается при использовании интенсивной технологии возделывания

ЛГ 5485

Толерантен к основным болезням подсолнечника и стабилен в засушливых условиях

Группа спелости: Среднеранний

Тип растения: высокорослый

Общие характеристики

- уникальное сочетание толерантности к засушливым условиям и толерантности к основным болезням
- высокий потенциал урожайности
- толерантен к новым расам ложной мучнистой росы
- устойчив к заразице А-G рас

Толерантность к заболеваниям

Фомопсис	9
Белая гниль корня	8
Белая гниль корзинки	9
Пепельная гниль	8
Сухая гниль	7
Фомоз	8
Ржавчина	8

Агрономические характеристики

- Средний диаметр корзинки, см: 16
- Средняя масса 1000 зерен, г: 72

Рекомендуемая густота на момент уборки

- зона достаточного увлажнения: 55-60 тыс./га
- зона недостаточного увлажнения: 50-55 тыс./га

Рекомендации по возделыванию

Прекрасно подходит для регионов распространением агрессивных рас заразицы

ТУНКА

Пластичен к засухе и технологии возделывания

Группа спелости: Среднеранний

Тип растения: среднерослый

Общие характеристики

- высокопродуктивный гибрид
- первый гибрид с устойчивостью к заразице рас А–G
- пластичный к условиям возделывания
- хорошая устойчивость к засухе

Толерантность к заболеваниям

Фомопсис	7
Белая гниль корня	7
Белая гниль корзинки	7
Пепельная гниль	7
Сухая гниль	7
Фомоз	7
Ржавчина	8

Агрономические характеристики

- Средний диаметр корзинки, см: 15,9
- Средняя масса 1000 зерен, г: 73

Рекомендуемая густота на момент уборки

- зона достаточного увлажнения: 50-55 тыс./га
- зона недостаточного увлажнения: 45-50 тыс./га

ЛГ 5580

Толерантен к новым расам ложной мучнистой росы, устойчив к засухе и заразице А—G рас

Группа спелости: Среднеранний

Тип растения: среднерослый

Общие характеристики

- устойчив к заразице рас А—G
- толерантен к новым расам ложной мучнистой росы
- высокопродуктивный гибрид
- пластичен к условиям возделывания
- высокая энергия начального роста
- прекрасная устойчивость к засухе

Толерантность к заболеваниям

Фомопсис	7
Белая гниль корня	7
Белая гниль корзинки	7
Пепельная гниль	7
Сухая гниль	7
Фомоз	7
Ржавчина	8

Агрономические характеристики

- Средний диаметр корзинки, см: 17
- Средняя масса 1000 зерен, г: 75

Рекомендуемая густота на момент уборки

- зона достаточного увлажнения: 50-55 тыс./га
- зона недостаточного увлажнения: 45-50 тыс./га

Рекомендации по возделыванию

Не рекомендуется загущение посевов

ЛГ 50514

Пластичный гибрид с высоким потенциалом масличности

Группа спелости: Среднеранний

Тип растения: среднерослый

Общие характеристики

- среднеранний гибрид
- высокий потенциал масличности
- стабильный урожай в различных условиях возделывания
- хороший профиль по устойчивости к заболеваниям
- толерантен к новым расам ЛМР
- устойчив к заразице рас А-G

Толерантность к заболеваниям

Фомопсис	9
Белая гниль корня	8
Белая гниль корзинки	7
Пепельная гниль	8
Сухая гниль	9
Фомоз	8
Ржавчина	9

Агрономические характеристики

- Средний размер корзинки, см: 16
- Средняя масса 1000 семян, г: 65

Рекомендуемая густота на момент уборки

- зона достаточного увлажнения: 55-60 тыс./га
- зона недостаточного увлажнения: 50-55 тыс./га

Рекомендации по возделыванию

Рекомендуется для хозяйств, ориентированных на высокий выход масла с гектара

ЛГ 50510

Интенсивный гибрид, обладающий хорошей пластичностью, отличным профилем по толерантности к заболеваниям и устойчивый к заразице А—G рас

Группа спелости: Среднеранний

Тип растения: среднерослый

Общие характеристики

- среднеранний гибрид
- высокий потенциал урожайности
- пластичен в различных условиях возделывания
- хорошая толерантность к основным заболеваниям, включая новые расы ЛМР
- устойчив к заразице рас А-G

Толерантность к заболеваниям

Фомопсис	9
Белая гниль корня	7
Белая гниль корзинки	8
Пепельная гниль	9
Сухая гниль	9
Фомоз	9
Ржавчина	8
Вертициллез	9

Агрономические характеристики

- Средний размер корзинки, см: 16
- Средняя масса 1000 семян, г: 65

Рекомендуемая густота на момент уборки

- зона достаточного увлажнения: 55-60 тыс./га
- зона недостаточного увлажнения: 50-55 тыс./га

Рекомендации по возделыванию

Рекомендован для интенсивной технологии возделывания

ЛГ 5463 КЛ

Ранний гибрид для производственной системы Clearfield® устойчивый к расам заразики A-G

Группа спелости: Ранний

Тип растения: среднерослый

Общие характеристики

- ранний гибрид с высоким потенциалом урожайности
- устойчив к гербициду ЕВРО-ЛАЙТНИНГ производственной системы CLEARFIELD
- пластичный к условиям возделывания
- гибрид с устойчивостью к заразики рас А–G
- толерантен к новым расам ложной мучнистой росы

Толерантность к заболеваниям

Фомопсис	7
Белая гниль корня	7
Белая гниль корзинки	7
Пепельная гниль	7
Сухая гниль	7
Фомоз	8
Ржавчина	5

Агрономические характеристики

- средний диаметр корзинки, см: 18
- средняя масса 1000 зерен, г: 72

Рекомендуемая густота на момент уборки

- зона достаточного увлажнения: 55-60 тыс./га
- зона недостаточного увлажнения: 50-55 тыс./га

ЛГ 5543 КЛ

Пластичный гибрид с хорошей устойчивостью к засухе для производственной системы Clearfield®

Группа спелости: Среднеранний

Общие характеристики

- устойчив к гербициду Евро-Лайтнинг® производственной системы Clearfield®
- пластичен к условиям возделывания
- хорошая устойчивость к засухе
- устойчив к болезням рас А-Е

Толерантность к заболеваниям

Фомопсис	7
Белая гниль корня	7
Белая гниль корзинки	7
Пепельная гниль	7
Сухая гниль	7
Фомоз	7
Ржавчина	8

Агрономические характеристики

- Средний диаметр корзинки, см: 18
- Средняя масса 1000 зерен, г: 74

Рекомендуемая густота на момент уборки

- зона достаточного увлажнения: 50-55 тыс./га
- зона недостаточного увлажнения: 45-50 тыс./га

Рекомендации по возделыванию

Не рекомендуется загущение посевов. Евро-Лайтнинг® рекомендуется применять в фазу 4-6 настоящих листьев при норме расхода препарата от 1л/га до 1,2 л/га

ЛГ 5542 КЛ

Засухоустойчивый гибрид толерантный к новым расам ложной мучнистой росы и устойчивый к расам заразики А—G для производственной системы Clearfield®

Группа спелости: Среднеранний

Общие характеристики

- устойчив к гербициду Евро-Лайтнинг® производственной системы Clearfield®
- гибрид с устойчивостью к заразику рас А—G
- пластичный к условиям возделывания
- засухоустойчивый гибрид
- толерантен к новым расам ложной мучнистой росы

Толерантность к заболеваниям

Фомопсис	7
Белая гниль корня	7
Белая гниль корзинки	7
Пепельная гниль	7
Сухая гниль	7
Фомоз	7
Ржавчина	8

Агрономические характеристики

- Средний диаметр корзинки, см: 15,9
- Средняя масса 1000 зерен, г: 71

Рекомендуемая густота на момент уборки

- зона достаточного увлажнения: 50-55 тыс./га
- зона недостаточного увлажнения: 45-50 тыс./га

Рекомендации по возделыванию

Не рекомендуется загущение посевов. Евро-Лайтнинг® рекомендуется применять в фазу 4-6 настоящих листьев при норме расхода препарата от 1л/га до 1,2 л/га

ЛГ 5555 КЛП

Высокоурожайный гибрид для засушливых условий возделывания для производственной системы

Clearfield plus®

Группа спелости: Среднеранний

Тип растения: Низкорослый

Общие характеристики

- высокоурожайный гибрид интенсивного типа
- устойчив к заразихе А-G рас и гербициду Евро-Лайтнинг Плюс
- адаптирован к засушливым условиям выращивания
- толерантен к новым расам ложной мучнистой росы

Толерантность к заболеваниям

Фомопсис	7
Белая гниль корня	7
Белая гниль корзинки	7
Пепельная гниль	7
Сухая гниль	7
Фомоз	7
Ржавчина	8

Агрономические характеристики

- Средний диаметр корзинки, см: 15.8
- Средняя масса 1000 зерен, г: 71

Рекомендуемая густота на момент уборки

- зона достаточного увлажнения: 50-55 тыс./га
- зона недостаточного увлажнения: 45-50 тыс./га

Рекомендации по возделыванию

Подходит для выращивания по интенсивной технологии в засушливых зонах с риском поражения заразихой. Евро-Лайтнинг® Плюс рекомендуется применять в фазу 4-6 настоящих листьев при норме расхода препарата от 1,6 л/га до 2,0 л/га

ЛГ 50635 КЛП

Высокопродуктивный гибрид устойчивый к расам заразики А—G и адаптированный для интенсивной технологии возделывания для производственной системы Clearfield plus®

Группа спелости: Среднеранний

Тип растения: среднерослый

Общие характеристики

- высокоурожайный гибрид интенсивного типа
- устойчив к гербициду ЕВРО-ЛАЙТНИНГ ПЛЮС производственной системы CLEARFIELD PLUS
- устойчив к заразики рас А—G
- пластичный к условиям возделывания
- высокая толерантность к основным заболеваниям
- толерантен к новым расам ложной мучнистой росы

Толерантность к заболеваниям

Фомопсис	9
Белая гниль корня	8
Белая гниль корзинки	8
Пепельная гниль	8
Сухая гниль	8
Фомоз	9
Ржавчина	9

Агрономические характеристики

- средний диаметр корзинки, см: 18
- средняя масса 1000 зерен, г: 75
- средняя высота растений, см: 165

Рекомендуемая густота на момент уборки

- Зона достаточного увлажнения: 55-60 тыс./га
- Зона недостаточного увлажнения: 50-55 тыс./га

Рекомендации по возделыванию

Потенциал урожайности максимально раскрывается при соблюдении интенсивной технологии. Евро-Лайтнинг® Плюс рекомендуется применять в фазу 4-6 настоящих листьев при норме расхода препарата от 1,6 л/га до 2,0 л/га

ЛГ 59580

Первый гибрид подсолнечника от компании «Лимагрен», оптимизированный для гербицида Экспресс® компании FMC и устойчивый к расам заразихи А—G

Группа спелости: Среднеранний

Тип растения: среднерослый

Общие характеристики

- высокий потенциал урожайности и масличности;
- адаптирован к засушливым условиям выращивания;
- высокая энергия начального роста;
- устойчив к заразихе рас А-G;
- толерантен к новым расам ЛМР

Толерантность к заболеваниям

Фомопсис	7
Белая гниль корня	7
Белая гниль корзинки	7
Пепельная гниль	7
Сухая гниль	7
Фомоз	7
Ржавчина	8

Агрономические характеристики

- средний диаметр корзинки, см: 18
- средняя масса 1000 зерен, г: 73

Рекомендуемая густота на момент уборки

- Зона достаточного увлажнения: 55-60 тыс./га
- Зона недостаточного увлажнения: 50-55 тыс./га

Рекомендации по возделыванию

Гибрид отлично подходит для засушливых зон с агрессивными расами заразихи. Не рекомендуется загущение посевов. Гербицид Экспресс® применяют в фазе 2-8 листьев подсолнечника. Норма применения 0,025-0,05 кг/га совместно с 200 мл/га ПАВ Тренд 90 (0,1% р-р.).

Гибриды подсолнечника компании RAGT



ИОЛНА

Очень ранний высокоолеиновый гибрид с высоким показателем масличности

Характеристики гибрида

Группа спелости: 97-102 дней

Тип гибрида: высокоолеиновый

Преимущества

- Прекрасное соотношение продуктивность / скороспелость
- Высокие показатели масличности – до 51%
- Содержание олеиновой кислоты до 90%

Рекомендуемая густота на момент уборки

Оптимальные условия: 60 000-65 000 тыс./га

Засушливые условия: 50 000-55 000 тыс./га

Толерантность к болезням

Стрессоустойчивость	8
Толерантность к фомопсису	7
Толерантность к вертициллезу	7
Толерантность к полеганию	8
Толерантность к фомозу	7
Толерантность к склеротиниозу стебля	7

РЖТ ВОЛКАНО КЛП

Ранний высокоолеиновый гибрид адаптированный для технологии возделывания для производственной системы Clearfield plus®

Характеристики гибрида

Группа спелости: **97-102 дней**

Тип гибрида: высокоолеиновый

Преимущества

- Высокоолеиновый гибрид по технологии CLEARFIELD PLUS
- Прекрасное соотношение продуктивность / скороспелость
- Высокие показатели масличности - до 52%
- Содержание олеиновой кислоты до 90%

Рекомендуемая густота на момент уборки

Оптимальные условия: 60 000-65 000 тыс./га

Засушливые условия: 50 000-55 000 тыс./га

Толерантность к болезням

Стрессоустойчивость	8
Толерантность к фомопсису	7
Толерантность к вертициллезу	8
Толерантность к полеганию	8
Толерантность к фомозу	8
Толерантность к склеротиниозу стебля	8

РЖТ НИКОЛЛЕТА

Ранний гибрид, устойчивый к болезням, с высокими показателями к болезням А-В рас

Характеристики гибрида

Группа спелости: **98-103** дней

Тип гибрида: **классический**

Преимущества

- Хороший потенциал в ранней группе
- Толерантность к расам болезней А-В+
- Высокое содержание масла 50-52%

Рекомендуемая густота на момент уборки

Оптимальные условия: **60 000-65 000** тыс./га

Засушливые условия: **50 000-55 000** тыс./га

Толерантность к болезням

Стрессоустойчивость	8
Толерантность к фомопсису	8
Толерантность к вертициллезу	7
Толерантность к полеганию	8
Толерантность к фомозу	7
Толерантность к склеротиниозу стебля	7

ВЕЛЛОКС

Стабильный высокомасличный гибрид с отличным потенциалом в своей группе

Характеристики гибрида

Группа спелости: 100-105 дней

Тип гибрида: классический

Преимущества

- Отличный потенциал в своей группе
- Высокие показатели масличности - 54-60%
- Стабильность показателей

Рекомендуемая густота на момент уборки

Оптимальные условия: 60 000-65 000 тыс./га

Засушливые условия: 50 000-55 000 тыс./га

Толерантность к болезням

Стрессоустойчивость	9
Толерантность к фомопсису	9
Толерантность к вертициллезу	7
Толерантность к полеганию	8
Толерантность к фомозу	7
Толерантность к склеротиниозу стебля	7

РЖТ ВОЛЛЬФ

Стабильный высокомасличный гибрид с отличным потенциалом в своей группе, устойчивый к заразихе А-Е рас

Характеристики гибрида

Группа спелости: 100-105 дней

Тип гибрида: классический

Преимущества

- Лидер в своей группе спелости по урожайности
- Толерантность к расам заразихи А-Е
- Высокое содержание масла 54-60%
- Стабильность показателей

Рекомендуемая густота на момент уборки

Оптимальные условия: 60 000-65 000 тыс./га

Засушливые условия: 50 000-55 000 тыс./га

Толерантность к болезням

Стрессоустойчивость	9
Толерантность к фомопсису	9
Толерантность к вертициллезу	7
Толерантность к полеганию	8
Толерантность к фомозу	7
Толерантность к склеротиниозу стебля	7

РЖТ ТАЛЛИСМАН

Стабильный высокомасличный гибрид с отличным потенциалом в своей группе, устойчивый к заразихе А-Г рас

Характеристики гибрида

Группа спелости: 100-105 дней

Тип гибрида: классический

Преимущества

- Толерантность к расам заразихи А-Г+
- Отличный потенциал в своей группе
- Высокие показатели масличности 54-60%
- Стабильность показателей

Рекомендуемая густота на момент уборки

Оптимальные условия: 60 000-65 000 тыс./га

Засушливые условия: 50 000-55 000 тыс./га

Толерантность к болезням

Стрессоустойчивость	9
Толерантность к фомопсису	9
Толерантность к вертициллезу	8
Толерантность к полеганию	8
Толерантность к фомозу	8
Толерантность к склеротиниозу стебля	8

Гибриды подсолнечника компании BREVANT



8Н270КЛДМ

Очень ранний пластичный гибрид для производственной системы Clearfield

Основные преимущества

- Раннеспелый трёхлинейный гибрид
- Устойчив к гербициду ЕВРО-ЛАЙТНИНГ® производственной системы CLEARFIELD®
- Обладает генетической устойчивостью к разным видам ложной мучнистой росы
- Стабильный урожай в засушливых зонах
- Пластичный к различным условиям выращивания

Характеристики

Энергия прорастания	8
Стебель	8
Корень	8
Опыляемость	9
Ранний налив семян	7
Высыхание корзинки	8

Использование

Традиционное подсолнечное масло

Масличность до 52%

Содержание олеиновой кислоты в масле до 71,2%

Агрономические особенности

Группа спелости	раннеспелый
Дней до цветения	60
Дней до физиологической спелости	95-100
Высота растения	7
Устойчивость к загущению	9
Положение корзинки	полувертикальное
Плотность семян в корзинке	9

Устойчивость к болезням

Фомопсис	6
Ржавчина	8
Склеротиниоз корзинки	7
Склеротиниоз стебля	5
Вертициллийоз	6

Регионы возделывания Центральный, Южный, Приволжский, Уральский

8X288KЛДМ

Очень ранний пластичный высокоолеиновый гибрид со стабильными показателями масличности для производственной системы Clearfield

Основные преимущества

- Раннеспелый трёхлинейный гибрид
- Устойчив к гербициду ЕВРО-ЛАЙТНИНГ® производственной системы CLEARFIELD®
- Обладает генетической устойчивостью к различным расам ложной мучнистой росы
- Стабильный урожай в засушливых зонах
- Пластичный к различным условиям выращивания
- Хорошо адаптирован для системы No-Till
- Один из двух существующих на рынке раннеспелых гибридов, сочетающих в себе систему CLEARFIELD® и высокое содержание олеиновой кислоты в масле

Характеристики

Энергия прорастания	7
Стебель	7
Корень	9
Опыляемость	8
Ранний налив семян	7
Высыхание корзинки	8

Использование

Предназначен для получения масла с высоким содержанием олеиновой кислоты

Масличность до 52%

Содержание олеиновой кислоты в масле до 85,8%

Агрономические особенности

Группа спелости	раннеспелый
Дней до цветения	60
Дней до физиологической спелости	95-100
Высота растения	7
Устойчивость к загущению	9
Положение корзинки	полувертикальное
Плотность семян в корзинке	9

Устойчивость к болезням

Фомопсис	8
Ржавчина	8
Склеротиниоз корзинки	7
Склеротиниоз стебля	6
Вертициллийоз	8

Регионы возделывания

Центральный, Южный, Приволжский, Уральский

8Н358КЛДМ

Пластичный гибрид с высокой энергией стартового роста, адаптированный для производственной системы Clearfield

Основные преимущества

- Трёхлинейный гибрид
- Устойчив к гербициду ЕВРО-ЛАЙТНИНГ® производственной системы CLEARFIELD®
- Обладает генетической устойчивостью к различным расам ложной мучнистой росы
- Отличный стартовый рост
- Стабильный урожай в засушливых зонах
- Гибрид средней высоты

Характеристики

Энергия прорастания	7
Стебель	7
Корень	8
Опыляемость	7
Ранний налив семян	7
Высыхание корзинки	8

Использование

Традиционное подсолнечное масло

Масличность до 50%

Содержание олеиновой кислоты в масле до 65,1%

Агрономические особенности

Группа спелости	среднеранний
Дней до цветения	64
Дней до физиологической спелости	100-110
Высота растения	7
Устойчивость к загущению	7
Положение корзинки	полувертикальное
Плотность семян в корзинке	8

Устойчивость к болезням

Фомопсис	7
Ржавчина	8
Склеротиниоз корзинки	7
Склеротиниоз стебля	6
Вертициллийоз	8

Регионы возделывания

Центральный, Южный, Приволжский, Уральский

8X477КЛ

Высокоолеиновый гибрид с высоким потенциалом урожайности, адаптированный для производственной системы Clearfield

Основные преимущества

- Среднепоздний простой гибрид с высоким потенциалом урожайности
- Высокое содержание олеиновой кислоты в масле
- Устойчив к гербициду ЕВРО-ЛАЙТНИНГ® производственной системы CLEARFIELD®
- Очень хорошая завязываемость семян
- Очень высокий потенциал урожайности

Характеристики

Энергия прорастания	8
Стебель	8
Корень	7
Опыляемость	8
Ранний налив семян	8
Высыхание корзинки	7

Использование

Предназначен для получения масла с высоким содержанием олеиновой кислоты

Содержание масла до 52%

Содержание олеиновой кислоты до 92%

Агрономические особенности

Группа спелости	среднепоздний
Дней до цветения	68
Дней до физиологической спелости	112-117
Высота растения	6
Устойчивость к загущению	8
Положение корзинки	полувертикальное
Плотность семян в корзинке	8
Самоопыляемость корзинки	9
Дружность цветения	8

Устойчивость к болезням

Фомопсис	7
Ржавчина	8
Склеротиниоз корзинки	7
Склеротиниоз стебля	7
Вертициллийоз	8

Регионы возделывания

Южный, Нижнее Поволжье

Продукты компании BASF





Двухкомпонентный гербицид для системы Clearfield против однолетних злаковых и двудольных сорняков

Преимущества

- Один препарат против всех видов сорняков, включая заразиху
- Может использоваться в системах с минимальной и нулевой обработкой почвы
- Простота и гибкость в сроках применения
- Экономия ресурсов

Характеристики препарата

Действующие вещества: 33 г/л имазамокс+15 г/л имазапир

Препаративная форма: ВРК (водорастворимый концентрат)

Рекомендуемая норма расхода: 1,0-1,2 л/га

Культура: Подсолнечник, устойчивый к гербициду ЕВРО-ЛАЙТНИНГ

Спектр действия: Однолетние злаковые и двудольные сорняки

Сроки применения: Опрыскивание посевов в ранние фазы роста сорняков (2–4 листьев) и 4–5 настоящих листьев у культуры. Ограничения по севообороту: можно высевать пшеницу, рожь не ранее, чем через 4

месяца; люцерну, сою, ячмень, овес, кукурузу, горох — через 9 месяцев. Картофель, томат, табак, лук, просо, салат, подсолнечник, огурец, морковь можно высевать через 19 месяцев; сахарную и столовую свеклу, рапс — через 26 месяцев. Расход рабочей жидкости — 200–300 л/га

Упаковка Пластиковые канистры: 2 х 10 л

Евро-лайтнинг Плюс, ВРК



Clearfield® Plus

Производственная система для подсолнечника

Двухкомпонентный гербицид с усиленной препаративной формой против широкого спектра сорняков для системы Clearfield® Plus.

Преимущества

- Усиленная препаративная форма
- Превосходный контроль сорняков
- Гибкая норма расхода
- Высокая урожайность и масличность подсолнечника

Характеристики препарата

Действующие вещества: Имазамокс (16,5 г/л) + Имазапир (7,5 г/л)

Препаративная форма: ВРК (водорастворимый концентрат)

Рекомендуемая норма расхода: 1,6–2,0 л/га

Культура: Подсолнечник, устойчивый к гербициду ЕВРО-ЛАЙТНИНГ ПЛЮС

Спектр действия: Однолетние злаковые и двудольные сорняки

Сроки применения: Опрыскивание посевов в ранние фазы роста сорняков (2–4 листьев) и 4–5 настоящих листьев у культуры. Ограничения по севообороту: пшени- цу и рожь можно высевать не ранее, чем через 4 месяца; люцерну, сою, ячмень, овес, кукурузу, горох — через 9 месяцев после применения препарата. Картофель, томаты, табак, лук, просо, салат, подсолнечник, огурцы, морковь можно высевать через 19 месяцев; сахарную и столовую свеклу, рапс — через 26 месяцев. Расход рабочей жидкости — 200–300 л/га

Упаковка Пластиковые канистры: 2 х 10 л